


Les infections
sexuellement
transmissibles (IST)
sont des infections
transmises par le
contact sexuel :
vaginal, oral et anal.

LES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES


Que sont les IST et comment les éviter ?



Le VIH / Sida



Lymphogranulomatose
vénérienne (LGV)



L'hépatite B



La syphilis



Les IST peuvent avoir de graves conséquences pour la santé des hommes et des femmes. Certaines IST rendent plus probable la contraction ou la transmission du VIH. Certaines, mais pas toutes, sont curables. D'autres, comme le VIH, ne le sont pas.

Pour prévenir la contraction ou la transmission d'IST

- Utiliser le préservatif masculin ou féminin et éviter le contact sexuel propice à l'infection. Le préservatif protège contre la plupart des IST (y compris le VIH).
- Se faire vacciner contre les IST pour lesquelles il existe un vaccin : par exemple l'hépatite B.

L'obtention rapide d'un traitement élimine ou réduit les conséquences de la plupart des IST. Afin de bénéficier d'un traitement efficace, il faut d'abord se faire tester.

Quand se faire tester ?

Une personne court le risque de contracter une IST et doit se faire tester quand :

- elle présente les symptômes d'une IST ;
- son ou sa partenaire sexuel(le) a une IST ou en présente les signes ;
- elle a plusieurs partenaires sexuel(le)s ;
- elle a un nouveau (une nouvelle) partenaire depuis trois mois ;
- elle a un(e) partenaire qui en a (peut-être) d'autres; et/ou
- elle a un(e) partenaire qui vit ailleurs ou qui voyage beaucoup.

Un couple ne doit pas reprendre son activité sexuelle tant que les deux partenaires n'ont pas été testés et achevé le traitement nécessaire.